


Systemiczna moc miedzi w duecie z siarką



najwyższa efektywność miedzi
systemicznej dzięki skompleksowaniu
kwasem heptaglukonowym

uzupełnia niedobory roślin
w miedź i siarkę

utrzymuje wysoką
zdrowotność roślin

jest bezpieczny w stosowaniu
- nie powoduje uszkodzenia roślin

inCu 80 HGL



INO Cu80 HGL to skoncentrowany nawóz płynny zawierający miedź skompleksowaną kwasem heptaglukonowym i siarkę do dolistnego stosowania.



składniki odżywcze:

**miedź Cu 80 g/l (6%)
skompleksowana kwasem heptaglukonowym**

siarka SO₃ 98 g/l (7,5%)

surowiec: siarczan miedzi
masa netto: 1,306 kg
pH: 4,7
opakowania: 1l, 5l, 10l, 200l

Kwas heptaglukonowy, jako organiczny związek kompleksujący miedź zwiększa jej przyswajalność i wykorzystanie przez rośliny:

- wysoka zdolność kompleksowania miedzi
- wysoka dostępność dla roślin bez ryzyka wytrącania
- związek nietoksyczny dla komórek roślinnych, zachowujący się jak cukier
- wspomaga pokrycie i przyleganie produktu na powierzchni liści
- najwyższa skuteczność działania i dostępność dla roślin bez wystąpienia ryzyka fitotoksyczności
- naturalny i całkowicie biodegradowalny produkt bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne



- odżywcza moc miedzi systemicznej i siarki
- silne wsparcie wysokiej zdrowotności oraz dopełnienie strategii fungicydowej roślin uprawnych
- bardzo wysoka penetracja wewnątrz liści oraz bardzo dobre pokrycie
- odporność na wypłukiwanie dzięki zjawisku adhezji = lepsza skuteczność
- brak negatywnego wpływu na wzrost roślin oraz wyższa efektywność procesu fotosyntezy (cukier)
- bezpośrednie działanie na procesy enzymatyczne oraz fotosyntezę
- do stosowania także w rolnictwie ekologicznym – spełnia wymogi UE
- możliwość mieszania z większością fungicydów i insektycydów
- nie łączyć z produktami bakteriijnymi oraz w przypadku ich stosowania zachować odstęp do 5 dni przed lub po zastosowaniu INO Cu80 HGL



Zastosowanie:

uprawa	stosowanie	dawka jednorazowa	ilość wody	ilość zabiegów
zboża	I. jesienią od fazy rozwoju liści do fazy końca krzewienia BBCH 12-29 II. w fazie końca krzewienia do końca fazy liścia flagowego BBCH 30-39	0,7-1,5l/ha	100-200l/ha	I-III
rzepak	I. jesienią - faza 4-6 liści BBCH 14-16 II. od fazy wiosennego ruszenia rośliny do fazy zwanego pąka BBCH 19-51	0,7-1,5l/ha	100-200l/ha	I-II
kukurydza	I. od fazy 5 liści do fazy 8 liści	0,7-1,5l/ha	100-200l/ha	I
buraki cukrowe	I. od fazy 4 liścia do fazy zwanego międzyrzędzi BBCH 14-39	1-2l/ha	200-400l/ha	I-III
ziemniaki	I. od fazy zwanego międzyrzędzi do początku fazy dojrzewania BBCH 33-81	1-2l/ha	200-400l/ha	II-IV
warzywa	2-4 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu	1-2l/ha	200-400l/ha	II-IV
truskawki	w roku nasadzeń: do 3 zabiegów od fazy regeneracji roślin do spoczynku zimowego w roku produkcyjnym: 3-4 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu	1-2l/ha	200-600l/ha	I-IV
owoce (borówka, malina, czereśnia, wiśnia, śliwa, winorośl)	do 3 zabiegów w okresie intensywnego wzrostu	2l/ha	500-1000l/ha	I-III
drzewa ziarnkowe jabłoni, grusza	do 3 zabiegów w ciągu sezonu wegetacyjnego	2l/ha	500-1000l/ha	I-II

Istnieje także możliwość stosowania produktu doglebowo - fertygacja w dawce 2-3 l/ha.